

Semana 14

Objetivo N° 14

Inventario Florístico y de Malezas. Estudios de Vegetación.



Análisis de la Comunidad Vegetal

Cualquier análisis de una comunidad vegetal debe cumplir con las siguientes bases mínimas:

- Composición florística
- Composición de formas biológicas
- Estructura de la vegetación



Inventario Florístico

Determinar mediante el muestreo botánico las familias, géneros y especies de un área determinada.

Cualquier inventario florístico debe intentar captar la mayor variabilidad del componente vegetal en el área estudiada. Donde en cada área debe determinarse el número de especies, géneros y familias (Bravo *et. al.*, 2002; Higgins & Ruokolaine, 2003).





Composición de formas biológicas (biotipos):

Inventariar las distintas expresiones adaptativas de las plantas en respuesta a su medio ambiente.



Estructura de la vegetación: Se considera como el arreglo espacial de las especies en una formación vegetal (horizontal y vertical) y por la abundancia de dichas especies en cada una de ellas.



Factores que deben tomarse en cuenta al momento de realizar muestreo de vegetación

1) Área mínima de muestreo (formaciones vegetales boscosas)






Figura 1



2) Distribución espacial:



**Distribución
al azar
“bosque
tropical”**

**Distribución
uniforme
“cultivo”**

**Distribución
agregada
“árboles en sabana
arbolada”**

Características que deben cumplir las unidades muestrales (parcelas y transectas)

- Deben distinguirse claramente
- Las reglas de inclusión y exclusión deben establecerse con anterioridad
- Deben mantenerse los tamaños de las unidades durante todo el estudio.
- Las áreas de muestreo deben ubicarse en la misma dirección al gradiente de mayor diversidad.



Metodología

- Muestreo con parcelas:

Establecimiento de parcelas de gran tamaño (0,1 ha) o disponer de una serie de subparcelas. Utilizar diámetro mínimo de muestreo

- Muestreo en transectas:


Establecimiento de transectas de mínimo 50 metros.



Establecimiento de parcelas (vegetación boscosa):


La metodología de muestreo utiliza parcelas de 0,1 hectáreas (Gentry, 1982).

La parcela se divide en subparcelas, para facilitar el trabajo de campo.



Se muestrean todos los individuos, utilizando un diámetro mínimo de muestreo

Establecimiento de transectas, utilizando medida de distancia entre plantas y un punto elegido al azar.




Se utiliza en
comunidades
leñosas y herbáceas


- A) Individuo más cercano
- B) Vecino más cercano
- C) Pares al azar
- D) Cuadrantes centrados

Lanzamiento de cuadrados a lo largo de una transecta

Establecimiento de una transecta con intervalos de puntos, donde se lanzarán los cuadrados de área conocida. Este método se utiliza preferiblemente para inventariar comunidades de herbáceas.



$L = 1 \text{ m}$



Análisis de los resultados

La estructura de la vegetación se analiza a través de los valores relativos de los siguientes parámetros :

- * Abundancia o densidad
- * Frecuencia de una especie
- * Cobertura o dominancia
- * Índice de valor de importancia (IVI)



Densidad absoluta: número de individuos de la especie por unidad de superficie

Densidad relativa: densidad de una especie con respecto a la densidad total, expresada en porcentaje

Densidad Absoluta y Densidad Relativa (abundancia relativa)

$$D_r \text{ spx} = (D \text{ spx} / \sum D \text{ spp}) \times 100$$

Densidad absoluta para transectas:

$D_{\text{spx}} = (\# \text{ individuos sp x} / \text{total de individuos de todas las spp}) \times DT$ (densidad total)

$$DT = 1 / AM$$

Donde : AM: área media

DT: densidad total

Área Media: Representa una medida de la superficie promedio ocupada por los individuos de una especie, y es inversa a la densidad total.

Unidades de AM: $m^2 / \text{No. Individuos}$

Transectas:

$$AM = (Qm)^2$$

$$Qm = \sum \text{distancia punto - planta} / \text{número de medidas}$$


Frecuencia absoluta: la probabilidad de una especie de aparecer en el muestreo con respecto al total de unidades muestrales.

Frecuencia relativa: la probabilidad de una especie de aparecer en el muestreo con respecto al total de unidades muestrales., expresada en porcentaje.

Frecuencia absoluta y Frecuencia relativa:

$F_{S_{px}} = \# \text{ veces que aparece la } S_{px} / \# \text{ total unidades muestrales}$

$$Fr_{S_{px}} = (F_{S_{px}} / \sum F_{S_{ppx}}) \times 100$$



Dominancia absoluta: expresa el área ocupada por cada especie o cobertura en el área de muestreo..

Dominancia relativa: dominancia de una especie referida a la dominancia de todas las especies, expresada en porcentaje.

Dominancia Absoluta y Dominancia Relativa


$Do_{spx} = \sum \text{áreas basales de los individuos de la spx}$

$Ab_{spx} \text{ (área basal)} = \pi (DAP/2)^2$

$Dor_{spx} = (Do_{spx} / \sum Do_{spp}) \times 100$

3)

Area Basal



Área calculada que ocupa el tallo de una especie.

El cual se calcula:

$$Ab = \pi (DAP/2)^2$$

$$\pi = 3,1416$$

DAP= diámetro a la altura del pecho (1,3 m)

Diámetro mínimo utilizado: 10 cm., el cual asegura la medición de casi el mismo número de individuos que en parcelas de una hectárea (Gentry, 1982, 1988^a; Clinebell *et al.*, 1995; Phillips & Miller, 2002).

Índice de Valor de Importancia (IVI)

$$\text{IVI sp } x = \text{Fr spx} + \text{Dr spx} + \text{Dor spx}$$

El IVI representa la sumatoria de los valores de densidad relativa + Dominancia relativa+ frecuencia relativa; como una medida estandarizada de los parámetros estructurales de las especies, los cuales son utilizados para comparar la Representación de las especies en los transectos en términos de su abundancia, frecuencia y área basal.

Método	Tipo de vegetación	Tipo de análisis
Parcelas	Bosques	El análisis de la comunidad se realiza inventariando todos los individuos en la unidad muestral.
Transectas (vecino más cercano; pares al azar; individuo más cercano; cuadrante centrado)	Bosques, arbustales, herbazales	El análisis de la comunidad se realiza con una muestra representativa de la comunidad
Transectas con lanzamiento de cuadrado	Herbazales Inventarios de malezas	El análisis de la comunidad se realiza con una muestra representativa de la comunidad

Comparación entre comunidades

La medición de la similitud entre dos o más muestras o comunidades se realiza mediante índices, que desde el punto de vista cualitativo sólo se considera el número de especies, su ausencia o presencia en cada una de las partes a comparar (Índice de Sorensen).

$$IS = (2C / a + b) \times 100$$

a = # especies de la comunidad 1

b = # especies de la comunidad 2

c = # especies comunes en ambas comunidades

Representación esquemática de la estructura de la vegetación y composición florística

Perfiles de vegetación y aspectos florísticos

