

¿Qué cuidados debes tener mientras usas estos medicamentos?

- ☺ Visita **regularmente a tu médico** en especial los primeros meses del tratamiento. Es posible que varíe la dosis hasta lograr la dosis exacta que necesitas.
- ☺ **Utiliza una placa o carnet de identificación** que indique que usas estos medicamentos.
- ☺ **Evita tomar bebidas alcohólicas.** Estos medicamentos aumentan el efecto del alcohol.
- ☺ **Consulta con tu médico antes de usar otros medicamentos** como anti-**alérgicos**, sedantes, tranquilizantes, medicamentos para la fiebre o para dormir, entre otros, ya que aumentan su efecto a causa de los anticonvulsivantes.
- ☺ **No suspendas el tratamiento sin consultar a su médico.** Esto provocará que aparezcan las convulsiones nuevamente.
- ☺ Estos medicamentos pueden causar **sueño, vértigos, aturdimiento** o que los pacientes estén **menos alerta**. Asegúrate de saber cómo te afectan estos medicamentos antes de manejar o realizar trabajos peligrosos



Bibliografía

- Alonso, M ; Balleza, V. 1999. INFOPAC: Manual para el Farmacéutico. Caracas-Venezuela.
- Mycek, MJ; Harvey, R; Champe, P. F. 2006. Farmacología. 2° Ed. Mexico.



Universidad Central de Venezuela
Facultad de Farmacia
Escuela "Jesús María Bianco"



Anticonvulsivantes



Aquí encontrarás información importante sobre tu tratamiento

USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS

¿Anticonvulsivantes?

¿Antiepilépticos?

Los **ANTICONVULSIVANTES**, también conocidos como **antiepilépticos**, son medicamentos utilizados para prevenir las convulsiones típicas de la epilepsia u otros trastornos convulsivos.

Actúan a nivel del cerebro para disminuir la frecuencia y severidad de las convulsiones.

Existen diferentes tipos de medicamentos anticonvulsivantes con similar efectividad. Sin embargo, los efectos no deseados que pueden causar varían de unos a otros. Esa diferencia (su seguridad), casi siempre determina cuál de ellos se seleccionará para cada paciente.



Entre los medicamentos anticonvulsivantes puedes encontrar:

- ☞ Carbamacepina
- ☞ Clonazepam
- ☞ Diazepam
- ☞ Etosuximida
- ☞ Gabapentina
- ☞ Lamotrigina
- ☞ Fenobarbital
- ☞ Fenitoína
- ☞ Ácido Valproico
- ☞ Vigabatrina
- ☞ Topiramato.



Generalmente el tratamiento se inicia con un solo medicamento mientras las crisis convulsivas se controlan o aparecen signos de toxicidad. Cuando el tratamiento con un solo fármaco es ineficaz, posiblemente su médico incorpore un segundo medicamento.



Para que estos medicamentos hagan efecto es necesario que exista en sangre una cantidad constante de los mismos. Por ello es importante que:

- ☞ Cumplas cuidadosamente con las instrucciones y el horario que tu médico recomendó.
- ☞ No tomes dosis menores (pueden aparecer las convulsiones de nuevo).
- ☞ No tomes dosis mayores ni con más frecuencia (esto aumenta el riesgo de aparición de los efectos no deseados).

Es muy importante que lleves un control regular de la concentración en sangre de tus anticonvulsivantes, a fin de observar que se encuentra dentro de los niveles eficaces y seguros.