



Si consumes
Ginseng
junto a
medicamentos
este folleto
es para ti!

Si consumes Productos Naturales y Medicamentos:

- Coméntale SIEMPRE a tu médico y/o Farmacéutico todos los productos naturales y otros medicamentos que consumes.
- Controla, bajo la supervisión de tu médico y/o farmacéutico los efectos de tus terapias medicamentosas.
- Si sospechas de una interacción medicamentosa, dirígete tan pronto como puedas a tu médico.
- Cuando vayas a comenzar a consumir un Producto Natural infórmate primero de los verdaderos efectos que ejerce, y sus posibles interacciones, acércate a tu farmacéutico para que responda todas tus dudas.



Bibliografía:

Tatro, D,S. Drug Interaction Facts. The authority on drug interactions. 2010.



Universidad Central de Venezuela

Facultad de Farmacia

Escuela "Jesús María Bianco"



Ginseng

Interacciones Medicamentosas



¿Interacción Medicamentosa?

Una interacción medicamentosa es cuando un medicamento no ejerce su acción esperada, debido a que se encuentra afectado por la ingesta simultánea de otro medicamento, alimento, bebida o producto natural (como Hierba de San Juan, Sábila, Ginkgo biloba, etc)

Entre las alteraciones que se pueden presentar encontramos:

- Aumento del efecto terapéutico
- Disminución del efecto terapéutico
- Disminución de los efectos tóxicos
- Aumento de las reacciones adversas



Interacciones Medicamentosas del Ginseng

Medicamento	Interacción medicamentosa	Recomendaciones
Warfarina	Se puede observar disminuido el efecto anticoagulante de la Warfarina.	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar esta combinación: si es posible suspender el consumo de Ginseng. • Monitorear los parámetro anticoagulantes bajo supervisión médica, cuando se suspenda o comience el consumo de Ginseng. Y ajustar la dosis de Warfarina si es necesario.
Bubetamida Furosemida Torsemida	El efecto diurético de estos medicamentos se puede encontrar reducido.	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar esta combinación: si es posible suspender el consumo de Ginseng. • Monitorear efecto diurético bajo la supervisión médica, cuando se suspenda o comience el consumo de Ginseng. Y ajustar la dosis de los medicamentos en caso de ser necesario.
Digoxina	Se pueden observar falsos resultados de los niveles de Digoxina en sangre, por interferencia del Ginseng	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar esta combinación: preferiblemente suspender el consumo de Ginseng • Monitorear los niveles de Digoxina en sangre, si se sospecha de una interacción, suspender el consumo de Ginseng
Isocarboxazida Fenelzina Fenilalanina Tranilcipromina	Se potencian los efectos adversos de estos medicamentos, como dolor de cabeza, temblor, entro otros.	<ul style="list-style-type: none"> • Evitar esta combinación: si es posible suspender el consumo de Ginseng