


EL CHIPO




Transmisor del mal de chagas

¿Qué es el Chipo?



- Es un insecto que se alimenta de sangre. Puede picar al hombre y animales domésticos para alimentarse

- Puede actuar como transmisor del *Trypanosoma cruzi* (parásito causante del mal de chagas)



1. *Rhodnius prolixus*

2. *Panstrongylus geniculatus*

3. Ninfas de *Panstrongylus geniculatus*

2a. Macho 2b. Hembra

- Vive junto a ratas silvestres, cachicamos y rabipelados, en nidos de aves y madrigueras, huecos de árboles, en grietas debajo de las placas de las casas, en la corteza de los árboles, huecos y grietas en las paredes.

- Los chipos son de color marrón y presentan manchas oscuras alrededor de su cuerpo.

- La transmisión del parásito no se realiza por la picada, sino por el contacto o la ingesta del excremento del insecto.

- Son capaces de alcanzar volando hasta 20 pisos de un edificio e introducirse en viviendas elevadas.

Si consigue un Chipo en su casa, por ningún motivo atrape o manipule directamente a los chipos sino tiene las manos protegidas, preferiblemente utilice guantes o una bolsa plástica.

Nunca pise o aplaste un chipo para matarlo, puede atraparlo en un envase de vidrio, plástico o caja de fósforos.

Si tuvo contacto con un Chipo, lave inmediatamente muy bien con agua y jabón su piel.

¿Cómo atrapar un Chipo?



1) Abrir la caja de fósforos a medias y colocarla sobre el chipo.

2) Cubrir el chipo con la caja sin tocarlo con la mano, tomar la caja por los dos extremos y cerrarla.

Al atrapar el chipo coloque en el envase su nombre, hora y lugar donde los capturó, cierre el envase bien y si es necesario coloque cinta adhesiva alrededor, lleve el envase o caja a: *La Sección de Entomología Médica en el Instituto de Medicina Tropical UCV*. Telf: (0212) – 605-35-54

Recuerde que nunca debe manipular un chipo con las manos sin protección.

¿Qué hacer para protegerse de los Chipos?

- ° Colocar malla o tela metálica en las ventanas y puertas, y además bandas de goma (antibichos) en el borde inferior de las puertas.
- ° Sacudir las sábanas antes de dormir.
- ° Revisar los zapatos y ropa antes de ponérsela.
- ° No acumular periódicos ni cajas de cartón, lugares donde el chipo puede quedarse a vivir.
- ° Lavar muy bien las frutas y verduras antes de consumirlas.

¿Qué hacer en caso de ser picado por un Chipo?

Existen varias pruebas para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas, las cuales son realizadas en diferentes centros de atención médica. En caso de ser picado consulte a su médico y luego acuda al Instituto de Medicina Tropical de la UCV, donde le indicarán qué hacer.

Cualquier duda o pregunta, puede comunicarse con la Sección de Entomología Médica. **Telf: (0212)-605-35-54**, o por correo electrónico: rafael.reyes@ucv.ve // atcbianca@gmail.com



Escuela de Biología
Facultad de Ciencias, UCV

Texto:
Prof. Matías Reyes Lugo
Daniel Llavaneras
Ana Avílan
Diseño y Edición:
Lic. Arianna Thomas C.
atcbianca@gmail.com